

Кому проводить скрининг? <sup>a</sup>	Да/нет	Источник данных	Комментарий авторов
Нарушения со стороны ЖКТ			
ЭоЭ	Нет	Методические рекомендации	—
Аутоиммунный атрофический гастрит	Да	Методические рекомендации	—
СРК <sup>b</sup>	Да	Методические рекомендации	—
ВЗК <sup>b</sup>	Да	Экспертное мнение	Скрининг не требуется во время последующего наблюдения при ВЗК, если пациент хорошо отвечает на лечение
МК <sup>b</sup>	Да	Методические рекомендации	—
Нарушения со стороны печени/поджелудочной железы/селезенки			
Необъяснимые отклонения от нормы уровня панкреатических ферментов	Нет	Экспертное мнение	Скудные и противоречивые данные о том, чаще ли наблюдается целиакия в этой группе пациентов
Идиопатический панкреатит	Да	Методические рекомендации	—
Необъяснимые отклонения от нормы уровня печеночных ферментов	Да	Методические рекомендации	—
АИГ	Да	Методические рекомендации	В идеале скрининг следует проводить до того, как пациент с АИГ получит стероиды или иммунодепрессанты
ПБХ	Да	Методические рекомендации	—
Гипоспленизм или функциональная аспления, сопровождающаяся тяжелыми бактериальными инфекциями	Да	Методические рекомендации	Скрининг также следует проводить, если у пациента были тяжелые бактериальные инфекции, в частности, вызванные инкапсулированными бактериями
Эндокринологические нарушения			
СД1	Да	Методические рекомендации	Повторный скрининг у пациентов с СД1 и отрицательными результатами теста на целиакию через 2 года и 5 лет после постановки диагноза СД1
Тиреоидит Хашимото и болезнь Грейвса	Да	Методические рекомендации	—

СШ	Да	Методические рекомендации	—
Остеопения и остеопороз	Нет	Экспертное мнение	в
Дерматологические нарушения			
Герпетиформный дерматит	Да	Методические рекомендации	Всем пациентам с диагнозом герпетиформного дерматита следует выполнить биопсию двенадцатиперстной кишки перед началом БГД
Псориаз, другие дерматологические расстройства	Нет	Экспертное мнение	в
Нарушения со стороны полости рта			
Рецидивирующий афтозный стоматит	Да	Методические рекомендации	—
Дефекты эмали	Да	Методические рекомендации	—
Нарушения со стороны нервной системы			
Эпилепсия	Нет	Экспертное мнение	в
Идиопатическая атаксия	Да	Методические рекомендации	—
Периферическая нейропатия	Да	Методические рекомендации	—
Мигрень	Нет	Экспертное мнение	в
Нарушения со стороны женской репродуктивной системы			
Бесплодие	Нет	Экспертное мнение	—
РСА	Нет	Экспертное мнение	—
Отсроченное менархе/преждевременная менопауза	Да	Методические рекомендации	—
Генетические заболевания			
Синдром Дауна, синдром Тернера, синдром Вильямса	Да	Методические рекомендации	—
Прочие расстройства			
Синдром хронической усталости	Да	Методические рекомендации	—
IgA-нефропатия	Да	Методические рекомендации	—
IgAD	Да	Методические рекомендации	—
Родственники первой степени родства, даже без симптомов	Да	Методические рекомендации	—
Массовый скрининг в общей популяции	Нет	Методические рекомендации	—

а

*Скрининг включает серологическое тестирование при постановке диагноза и взятие надлежащего биопсийного материала из тонкой кишки, если пациенту, которому рекомендуется скрининг, по какой-либо причине выполняют эндоскопии верхних отделов желудочно-кишечного тракта.*

б

*Показания для скрининга на целиакию основаны не только на связях с целиакией, но и на том, что симптомы со стороны ЖКТ при этих заболеваниях могут быть обусловлены неверно классифицированной целиакией.*

в

*Рекомендуется проводить скрининг только в том случае, если у пациента имеются симптомы со стороны ЖКТ или другие данные, свидетельствующая о повышенном риске развития целиакии.*